



LIPOSOMAS ACELERADORES DEL BRONCEADO

CÓDIGO: LIP-17

Fecha de última revisión: 20.12.2024

INCI name: WATER (AQUA) (AND) PHOSPHOLIPIDS (AND) HYDROLYZED RICE PROTEIN (AND) PHENOXYETHANOL (AND) SODIUM DNA (AND) TYROSINE (AND) BETA-CAROTENE (AND) ADENOSINE TRIPHOSPHATE (AND) TOCOPHERYL ACETATE (AND) RIBOFLAVIN.

CARACTERÍSTICAS: Liposomas para acelerar el bronceado, que encapsulan y transportan Hidrolizado de Proteínas de arroz, ADN de origen vegetal, Tirosina, Beta Caroteno, ATP, Vitamina E Acetato y Riboflavina.

COMPONENTES (NOMENCLATURA INCI)	% (peso)	CAS #
Water (Aqua)	87,250	7732-18-5
Phospholipids	10,000	123465-35-0
Hydrolyzed Rice Protein	1,000	156715-40-1
Sodium DNA	0,500	-----
Tyrosine	0,050	556-02-5 / 556-03-6 / 60-18-4
b-Carotene	0,050	7235-40-7
Adenosine Triphosphate	0,050	56-65-5
Tocopheryl acetate	0,050	7695-91-2 / 58-95-7
Riboflavin	0,050	83-88-5
Conservantes: Phenoxyethanol	1,000	122-99-6

Tamaño del liposoma:	100 – 350 nm. (DLS)
Método de producción:	Microfluidificación
Carga neta del liposoma:	Negativa
Tipo de liposoma:	Oligo-unilamelar
Color:	Amarillo intenso a anaranjado
Aspecto:	Líquido ligeramente opalescente. Ausencia de materia extraña
Olor:	Suave, agradable
pH:	6,00 - 7,50 (a 25°C) (USP XXVII)
Densidad relativa:	0,980 – 1,050 (picnometría) (a 20°C) (USP XXVII)
Residuo seco:	12 gr.% mínimo. (0,5 gr. 1 hora 110°C)
Control microbiológico:	Mesófilos aerobios: menos de 200 UFC/gr. Hongos: menos de 20 UFC/gr. Ausencia de patógenos.

Conservar refrigerado en heladera (5-15°C). No congelar. Mantener alejado de la luz. Agitar antes de usar.

USO COSMÉTICO EXTERNO